

# **QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE PRISHTINË**

**Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në të gjitha QMF e komunës së  
Prishtinës gjatë muajit Shkurt 2015**

**Komiteti per Sigurimin e Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore  
Korrik 2015**

## Hyrje

Arsyet e monitorimit të trajtimit të pacientëve me antibiotikë në kujdesin parësor shëndetësorë janë :

- Mbikëqyrja dhe zvogëlimi i rezistencës antimikrobike , rritja e së cilës është problem global i shëndetit publik me implikime ekonomike, sociale dhe politike, veçanërisht në vendet e pazhvilluara. Gjatë viteve të fundit kjo sfidë ka shënuar dyfishim në nivelin global duke rrezikuar seriozisht mjekimin efikas të shumë sëmundjeve. (*“Strategjia dhe plani i veprimit për rezistencën antimikrobike” miratuar nga Ministria e Shëndetësisë 2011*)
- Në kuader të aktiviteteve për kontroll të infeksionit institucioni shëndetësor duhet të ketë një program të mbikëqyrjes së dhenies së antibiotikeve („*Standardet e cilësisë për licencimin dhe akreditimin e institucioneve të KPSH*“ Ministria e Shëndetësisë 2005 )
- Fokusimi kryesor i kontrolloimit të rezistencës antimikrobike është ngritja e cilësisë së përshkrimit të antibiotikëve në kujdesin primar shëndetësor pasi më shumë se 90 % e antibiotikëve përshkruhen nga mjekët familjar dhe mjekët e përgjithshëm .Shumica e antibiotikëve që jepen në praktikën e mjekësisë familjare u dedikohen infeksioneve të traktit respirator të cilat përfaqësojnë rreth 70% të gjitha infeksioneve të trajtuara në kujdesin primar shëndetësor . Përderisa 90 % e të gjitha infeksioneve respiratore shkaktohen nga virusët, dhënia e antibiotikëve në këto raste jo vetëm që nuk sjellë ndonjë përfitim për pacientin por shkakton edhe shfaqjen e efekteve anësore dhe rritjen e rezistencës antimikrobike . (*Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT), BMC Family Practice 2010* )

Shfaqja dhe përhapja e rezistencës antimikrobike është një problem kompleks që gërsheton faktorë të ndryshëm megjithatë, shpërdorimi i antimikrobikëve është faktori kyç që përshpejton shfaqjen e rezistencës antimikrobike. Profilet më të shpeshta të shpërdorimit të antibiotikëve ndodhin në këto raste:

- Përdorimi i antimikrobikëve për sëmundje që kanë natyrë të qartë virale dhe pa indikacion të qartë;
- Mbështetja në antimikrobikët e spektrit të gjerë në rastet kur përdorimi i atyre me spektër të ngushtë është adekuat;
- Gabimet në kohëzgjatjen e profilaksisë kirurgjike;
- Ndërprerja e parakohshme të terapisë nga vetë pacientët;
- Shkalla e ulët e përdorimit të prodhimeve që mund ta sigurojnë alternativa më të sigurta dhe efektive (kondomat, vaksinat);
- Mospërdorimi i antimikrobikëve për shkak të mungesës së tyre;
- Shkalla e ulët e përdorimit të masave tjera për parandalimin e infeksioneve siq është higjiena e duarve etj.

*Përdorimi i injeksioneve arsyetohet në dy raste, e para është kur kërkohet një efekt i shpejt dhe arsyeja e dytë është sepse forma e injektueshme është e vetmja formë dozimi e cila mund të japë efektin që kërkohet. Organizata Botërore të Shëndetësisë (OBSH) “Udhëzues Për Përshkrim të Mirë”*

## *Objektivi*

Paraqitja e shkallës e trajtimit (ordinim dhe pershkrim) të pacientëve me antibiotikë (oral dhe parenteral) si dhe paraqitja e struktures së profilit të këtyre antibiotikëve në të gjitha Qendrat e Mjekësisë Familjare të komunës së Prishtinës gjatë muajit Shkurt 2015 .

## *Qëllimi*

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe atë duke zvogëluar keqpërdorimin e antibiotikëve posaçërisht antibiotikëve parenteral shumë të fortë të cilët duhet ruajtur për Kujdesin Sekondar apo sëmundjet më të rënda.

- Përdorimit sa më racional i antibiotikëve në përgjithësi, duke u bazuar në literaturën e bazuar në dëshmi
- Zvogëlimi i shpërdorimit sidomos të antibiotikëve parenteral dhe antibiotikëve me spektër të gjerë të veprimit
- Duke i siguruar dy pikat e para do të zvogëlohet edhe krijimi e rezistencës antimikrobike




## Materiali dhe metodologjia e punës

Në komunën e Prishtinës gjithsej janë 16 Qendra të Mjekësisë Familjare dhe 14 AMF. Për grumbullim e të dhënave për numrin dhe llojin e antibiotikëve është përipiluar lista për grumbullimin e të dhënave duke u bazuar ne Regjistrin e Barnave 3 të leshuar nga Ministria e shëndetësisë . Në këtë listë secili antibiotik është paraqitur me emër gjenerik dhe të mbrojtur . Ekipet punuese për grumbullimin e të dhënave në secilën QMF kanë nxjerrë dhe evidentuar të dhënat nga regjistri i pacientëve dhe urdhëresat për dhënien antibiotikëve për muajin Shkurt 2015 për secilin mjek familjar dhe pediatër .


Metoda është retrospektive, të dhënat janë përpunuar me metoda adekuate statistikore dhe janë paraqitur me tabela dhe diagrame të shoqëruara me komente përkatëse nga Dr Florie Hyseni – Morina kordinatore e cilësisë . Rezultatet janë parqitur per secilën qendër në veçanti dhe si rezultate të përgjithëshme në nivel të QKMF –s bashk me masat e rekomanduara në fund të punimit .

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 1 /Shkurt 2015


Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF1/MF/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF1/MF/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
parenteral përgjatë viteve /QMF 1




Nga diagramët e mësipërm shihet se përqindja me ulët e trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral nga mjekët familjar gjatë muajit Shkurt është 2% derisa përqindja më e lartë është 7% me një mesatare në nivel të qendrës prej 3% . Kurse përqindja me e ulët e trajtimit të pacientëve me antibiotikë oral është 2% dhe më larta është 27% me një mesatare në nivel të qendrës prej 6% .Përqindja e përgjithshme e trajtimit të pacientëve me antibiotikë në tërësi ( parenteral edhe oral) është 9% .

Nga rezultatet e paraqitura në shihet se trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 5.4 % në 3% .


**Profili i trajtimit të pacientëve me antibiotikë oral QMF 1 MF/ Shkurt 2015**




**Profili i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral QMF 1 MF/ Shkurt 2015**




**Profili i trajtimit të pacientëve me antibiotikë oral&parenteral QMF 1 MF/ Shkurt 2015**




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF1/Pediatri/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF1/Pediatri/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve /QMF 1




Nga rezultatet e paraqitura në diagramet e mësipërme shihet se përqindja e trajtimit të pacientëve me antibiotikë nga mjekët pediater në QMF 1 gjatë muajit Shkurt 2015 është 9.8 % dhe atë me përfaqsim 7.6 % të antibiotikëve oral dhe 2.2 % të antibiotikëve parenteral . Përgjatë viteve shkalla e trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral nga mjekët pediater ka rënë nga 4% në 2%




# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 2 /Shkurt 2015

Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF2/MF/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF2/MF/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral  
përgjatë viteve /QMF 2




Përqindja e trajtimit të pacientëve me antibiotikë në QMF 2 gjatë muajit Shkurt 2015 është 14%, me përfaqsim të antibiotikëve oral prej 9% dhe antibiotikëve parenteral 5%. Ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve në tri ciklet e fundit të auditit është zvogëluar nga 18% në 5%.

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 3 /Shkurt 2015


Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF3/MF/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF3/MF/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
parenteral përgjatë viteve /QMF 3




Shkalla e trajtimit të pacientëve me antibiotikë gjatë muajit Shkurt 2015 në QMF 3 është 15 % me përfaqsim prej 10 % të antibiotikëve oral dhe 5% të antibiotikëve parenteral

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 4 /Shkurt 2015


Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF4/MF/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF4/MF/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
parenteral përgjatë viteve /QMF 4




Përqindja e trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral nga mjekët familjar në QMF 4 gjatë muajit Shkurt 2015 është 15% me përfaqsim të antibiotikëve oral prej 10% dhe parenteral prej 5%. Nëse krahasohet tendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve shihet një zvogëlim i kësaj përqindjeje prej 9% në ciklin e parë të auditit në 5% në ciklin e fundit të auditit.


### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF4/Pediari/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF4/Pediatri/Shkurt 2015




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve / QMF 4 Ped




Perqindja e trajtimit të pacientëve me antibiotikë nga mjekët pediatër të QMF 4 gjatë muajit Shkurt 2015 është 15.6% me përfaqësim të antibiotikëve oral prej 14% dhe parenteral 1,6% .




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF4/NN/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF4/NN/Shkurt 2015




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve / QMF 4 NN




Shkalla e trajtimit të pacientëve me antibiotikë në ndërrimet e natës në QMF 4 është 27% me përfaqsim të antibiotikëve oral 12% dhe atyre parenteral 15% .

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 5 /Shkurt 2015


Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF5/MF/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF5/MF/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral  
përgjatë viteve /  
QMF 5/MF




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar të QMF 5 gjatë muajit Shkurt 2015 është 12 % me përfaqsim të antibiotikëve oral 8% dhe atyre parenteral 4%.


### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF5/Pediatri/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF5/Pediatri/Shkurt 2015





### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral pergjatë viteve / QMF 5 Pediatri



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët pediatër në QMF 5 gjatë muajit Shkurt 2015 është 7 % me përfaqsim të antibiotikëve oral 6% dhe atyre parenteral 1%, ndërsa trendi i trajtimit me antibiotikë parenteral pergjatë viteve është zvogëluar nga 4% në 1% .

## Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF5/NN&ShSh/Shkurt 2015






Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga ndërrimet e natës në QMF 5 gjatë muajit Shkurt 2015 është 17 % me përfaqsim të antibiotikëve oral 7% dhe atyre parenteral 10%, ndërsa trendi i trajtimit me antibiotikë parenteral pergjatë viteve është zvogëluar nga 13% në 10% .




# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 6 /Shkurt 2015

## Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF6/MF/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF 6 gjatë muajit Shkurt 2015 është 16% me përfaqsim të antibiotikëve oral 9 % dhe atyre parenteral 7 %


### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF6/Pediatri/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF6/Pediatri/Shkurt 2015




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve / QMF 6Ped




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët pediatër në QMF 6 gjatë muajit Shkurt 2015 është 24% me përfaqsim të antibiotikëve oral 16 % dhe atyre parenteral 8 %


### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF6/NN/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF6/NN/Shkurt 2015




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve /QMF 6 NN




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga ndërrimet e natës në QMF 6 gjatë muajit Shkurt 2015 është 30% me përfaqsim të antibiotikëve oral 6 % dhe atyre parenteral 24 %

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 7 /Shkurt 2015

Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF7/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF7/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
parenteral përgjatë viteve /QMF 7




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF 7 gjatë muajit Shkurt 2015 është 19% me përfaqsim të antibiotikëve oral 17 % dhe atyre parenteral 2 %, ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 21% në 2%.




# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 8 /Shkurt 2015


Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF8/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF8/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral  
përgjatë viteve /  
QMF 8




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF 8 gjatë muajit Shkurt 2015 është 21 % me përfaqsim të antibiotikëve oral 17 % dhe atyre parenteral 4 % .

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 9 /Shkurt 2015

Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF9/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF9/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral  
përgjatë viteve /  
QMF9




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF 9 gjatë muajit Shkurt 2015 është 16 % me përfaqsim të antibiotikëve oral 13 % dhe atyre parenteral 3 % .

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF 10 /Shkurt 2015


Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF10/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF10/Shkurt 2015






Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
parenteral përgjatë viteve /  
QMF 10



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF 10 gjatë muajit Shkurt 2015 është 14 % me përfaqsim të antibiotikëve oral 11 % dhe atyre parenteral 3 % . Ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 5% në 3% .

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF Hajvali /Shkurt 2015




## Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF Hajvali/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF Hajvali gjatë muajit Shkurt 2015 është 14 % me përfaqsim të antibiotikëve oral 11 % dhe atyre parenteral 3 % .

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF Besi /Shkurt 2015

Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF Besi/Shkurt 2015






Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF Besi gjatë muajit Shkurt 2015 është 11% me përfaqsim të antibiotikëve oral 7 % dhe atyre parenteral 4 % . Ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 20% në 4% .



# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF Mat /Shkurt 2015


Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
Mat/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF Mat gjatë muajit Shkurt 2015 është 16% me përfaqsim të antibiotikëve oral 12% dhe atyre parenteral 4 %

# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF Mat 1/Shkurt 2015

Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QMF  
Mat1/Shkurt 2015



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
QMF Mat1/Shkurt 2015






Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral  
përgjatë viteve /  
QMF Mat1



Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QMF Mat1 gjatë muajit Shkurt 2015 është 19% me përfqsim të antibiotikëve oral 7% dhe atyre parenteral 12%. Ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 20% në 12%


# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QKMF/Shkurt 2015

Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QKMF /MF/Shkurt 2015




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët familjar në QKMF gjatë muajit Shkurt 2015 është 8% me përfaqsim të antibiotikëve oral 6% dhe atyre parenteral 2%. Ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 5% në 2%.


### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QKMF/NN/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QKMF/NN/Shkurt 2015




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve /




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga ndërrimet e natës në QKMF gjatë muajit Shkurt 2015 është 14% me përfaqsim të antibiotikëve oral 9% dhe atyre parenteral 5%. Ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 12% në 5%.


### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QKMF/Pediatri/Shkurt 2015



### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë QKMF/Pediatri/Shkurt 2015




### Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve / QKMF Ped




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë nga mjekët peditër në QKMF gjatë muajit Shkurt 2015 është 9% me përfaqsim të antibiotikëve oral 8% dhe atyre parenteral 1%. Ndërsa trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve është zvogëluar nga 2.4% në 1.4%.



**Trajtimi i pacientëve me antibiotikë  
parenteral përgjatë viteve /  
QKMF MP**




**Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral  
QKMF Mjekesi e Punës/Shkurt 2015**




Trajtimi i pacientëve me antibiotikë parenteral në shërbimin e Mjekësisë së Punës gjatë muajit Shkurt 2015 është 4% .

## Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në QMF-t e komunës së Prishtinës /Shkurt 2015



Nga Diagrami i mësipërm shohim se shkalla më ulët e trajtimit të pacientëve me antibiotikë gjatë muajit Shkurt 2015 është në QMF 5 Pediatri (7%) dhe QKMF Mjekësi Familjare (8%) përderisa shkalla më e lartë e trajtimit të pacientëve me antibiotikë është në ndërrimet e natës në QMF 6 (30%) dhe QMF 4 (24%).




# Trajtimi i pacientëve me antibiotikë në të gjitha QMF-t e komunës së Prishtinës/Shkurt 2015



Përqindja e përgjithshme e trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral në nivel të të gjitha QMF-ve të komunës së Prishtinës gjatë muajit Shkurt 2015 është 13.6% ( 9.2% oral dhe 4.4% parenteral )

Nëse krahasohet trendi i trajtimit të pacientëve me antibiotikë parenteral përgjatë viteve shohim se ky trend është zvogëluar nga 6 % në 4.4 %

# Profili i antibiotikëve të ordinuar dhe përshkruar në të gjitha QMF -t e komunës së Prishtinës /Shkurt 2015



Në diagramet e mësipërme janë paraqitur profililet e antibiotikëve të ordinuar dhe përshkruar (oral dhe parenteral) gjatë muajit Shkurt 2015. Nga të gjithë këta antibiotikë përqindjen më të lartë të përfaqimit e kanë penicilinat me 49%.

## **MASAT E PROPOZUARA**

- Mbajtja e një takimi pune me grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe menaxhmentin e QMF-ve.
- Prezantimi i rezultateve gjatë ligjëratave të Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional
- Adresimi i nevojës për hartimin e udhërrëfyesve dhe protokoleve për Kujdesin Parësor Shëndetësor
- Ngritja e vazhdueshme e cilësisë së shërbimeve shëndetësore nëpërmes aktiviteteve të Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional duke u bazuar në literaturën bashkëkohore të bazuar në dëshmi, udhërrëfyes klinik dhe protokole
- Shtytja dhe përkrahja e vazhdueshme për vendosjen dhe funksionalitetin e Rishqyrtimeve e Kolegjiale në Qendrat e Mjekësisë familjare
- Antibiotikët dhe rezistenca antimikrobike të ligjërohen në aktiviteteve e Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional
- Një punë më e mirë e stafit mjekësorë e QMF-ëve në përgjithësi në edukimin shëndetësor për pacientë posaçërisht për terapinë parenterale.
- Zbatimi i Ligjit për punën e barnatoreve – Dhënia e barërave vetëm me recetë të mjekut.



## Literatura:

- „Standardet e cilësisë për licencimin dhe akreditimin e institucioneve të KPSH“ Ministria e Shëndetësisë 2005
- „ Të Menduarit Kritik dhe Hulumtimi“ Moduli në specializimin e mjekësisë Familjare 2010
- “Centers for Disease Control and prevention” (web site)
- “Udhëzues për Përshkrim të Mirë” një manual praktik botuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë 1995 përkthyer në shqip më 1999.
- "Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT), BMC Family Practice 2010
- “Strategjia dhe plani i veprimit për rezistencën antimikrobike” Ministria e Shëndetësisë 2011

Faleminderit !